

החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם



ISRAEL SOCIETY FOR COLPOSCOPY
AND CERVICAL PATHOLOGY

דף הסבר על קולפוסקופיה - הסתכלות על צוואר הרחם

הופנית לבדיקה של צוואר הרחם או הנרתיק על ידי רופא הנשים שלך עקב תוצאה בלתי תקינה של המשטח הציטולוגי (פאפ) שנלקח מצוואר הרחם, או עקב תסמינים עליהם דיווחת.

מטרת הבדיקה היא גילוי נגעים טרום ממאירים (סרטניים) בצוואר הרחם על ידי נטילת ביופסיה מכוונת. הבדיקה מתבצעת ע"י הסתכלות באמצעות מיקרוסקופ מיוחד על צוואר הרחם הנרתיק וקירות הנרתיק.

הרופא/ה יסביר/תסביר על כל פעולה על מנת להכיין ולקבל את הסכמתך.

הבדיקה דומה לבדיקה גינקולוגית רגילה.

הרופא/ה מניח על צוואר הרחם תמיסה חומצית מהולה (הדומה לחומץ) כדי להדגיש את הנגעים ופרט לצריבה קלה הפעולה אינה אמורה להיות כרוכה בכאב.

הרופא/ה ייטלו דגימת רקמה מצוואר הרחם (ביופסיה). במידה ויבחינו בנגעים אופייניים ולעיתים אף תילקח דגימה אקראית כאשר משטח הפאפ מחייב זאת. הביופסיה לעיתים כרוכה בהרגשת כאב קל או צביטה אך ניתן לאלחש מקומית בדריקה לצוואר הרחם אם יתעורר צורך.

תשובת הדגימה תתקבל לאחר 4-5 שבועות ואת תוזמני לקבל את התשובות ההיסטולוגיות, הסבר על משמעות התוצאות והמלצות להמשך הטיפול.

הננות לפני הבדיקה:

רצוי להצטייד במכתב הפניה מרופא הנשים, ובתשובות הבדיקות המקוריות שנלקחו ממך כולל משטח פאפ (PAP) או כל בדיקה אחרת.

הבדיקה אינה מתבצעת בזמן דימום או וסת. יש להימנע מלהחדיר לנרתיק ביום הבדיקה ויום קודם לכן משחות או נרות לטיפול בדלקות.

יש להימנע מקיום יחסי מין לפחות יום לפני הבדיקה.

רצוי לטפל בדלקות נרתיקיות מבעוד מועד כדי לשפר את איכות הבדיקה. חשוב לדווח לרופא/אחות היחידה על רגישות לתרופות או טיפול בנוגדי קרישה.

במידה ויש לך שאלות נוספות אנא הכיני רשימת שאלות ונשמח לענות ולהסביר לך.

החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה